

Über Mono- und Di- benzoylen- dinaphtylendioxyd.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Hans Stinzendörfer
aus Erlangen

Tag der mündlichen Prüfung: 27. Juni 1935.

Buchdruckerei Robert Windsheimer, Erlangen-Bruck.
1936

1936790

Referent: Prof. Dr. R. Pummerer
Dekan: Prof. Dr. J. Schwemmle



Meinen lieben Eltern in Dankbarkeit gewidmet.

*Vorliegende Arbeit wurde in der Zeit vom November 1933 bis März 1935 am
Chemischen Laboratorium der Universität Erlangen unter Leitung des*

Herrn Universitätsprofessor Dr. R. Pummerer

*ausgeführt, dem ich für die wohlwollende Unterstützung mit Rat und Tat mei-
nen ergebensten Dank ausspreche. Herrn Dr. W. Gündel, der mir zu Beginn
der Arbeit manchen Rat gab und Herrn Dr. R. Meister, der die Mikroanalysen
ausführte, sage ich an dieser Stelle herzlichsten Dank.*



Inhaltsangabe.

Seite

A. Einleitung.

B. Theoretischer Teil.

I. Die Benzoylierung des Dinaphtylendioxyds.	10
1. Die Darstellung des Dibenzoylkörpers.	10
2. Die Darstellung des Monobenzoylkörpers.	10
3. Dibenzoyl- und Monobenzoyldinaphtylendioxyd.	11
4. Die Bromderivate der Benzoyldinaphtylendioxydkörper.	11
5. Die o-Brombenzoylderivate des Dinaphtylendioxyds.	11
II. Warum findet die Benzoylierung des Dinaphtylendioxyds, in 4,4'- Stellung statt?	12
III. Versuche zur Darstellung des Benzoylen- und Di-benzoylendinaph- tylendioxyds, ausgehend v. d. Benzoyldinaphtylendioxydkörpern	15
1. Die Ringschlußmethoden.	15
a) Die Aluminiumchlorid-Schmelzen.	15
b) Die Chinolin-Ätzkali-Methode.	16
2. Benzoylen- und Dibenzoylen-dinaphtylendioxyd.	17
3. Betrachtungen zur Unverküppbarkeit des Dibenzoylen-dinaph- tylendioxyds.	19
4. Die in Alkali löslichen Körper.	20
IV. Schlußwort!	20

C. Experimenteller Teil.

I. Die Benzoylierung des Dinaphtylendioxyds.	22
1. Die Darstellung des Dibenzoylkörpers.	22
2. Bromierung des Dibenzoylkörpers.	24
3. Die Darstellung des Monobenzoylkörpers.	25
4. Die Darstellung des Mono-o-brombenzoyl-dinaphtylendioxyds.	26
5. Die Darstellung des Di-o-brombenzoyl-dinaphtylendioxyds.	27
II. Versuche zum Teil II des theoretischen Teils.	28
1. Das Verhalten des Dibenzoyldinaphtylendioxyds gegen Oxydations- mittel.	28
2. Das Verhalten des Dibenzoylkörpers gegen Benzoylperoxyd.	28
III. Versuche zur Darstellung der Benzoylenverbindungen, ausgehend von den o-bromierten Benzoylderivaten des Dinaphtylendioxyds.	29
1. Versuche mit Aluminiumchlorid.	29
2. Versuche mit Chinolin-Ätzkali.	30
a) Darstellung des Mono-benzoylen-dinaphtylendioxyds.	30
b) Darstellung des Di-benzoylen-dinaphtylendioxyds.	31
c) Der alkalilösliche Körper.	32



Digitized by the Internet Archive
in 2026

A. Einleitung.

Im Jahre 1905 entdeckten Bünzly und Decker¹⁾ Dinaphtylendioxyd, als sie ein Oxydationsprodukt des β -Dinaphtols der pyrogenen Zersetzung unterwarfen. Später wurde durch Pummerer, Prell und Rieche²⁾ ein geeignetes Verfahren angegeben, daß die Darstellung dieses Körpers in größeren Mengen gestattet. Man schmilzt nach diesem Verfahren β -Dinaphtol mit Kupferoxyd bei Gegenwart von wenig Nitrobenzol zusammen und erhält dabei Dinaphtylendioxyd in einer Ausbeute von 75—80 Prozent. Die in der Folgezeit erschienenen Patente, die sich mit der Darstellung des Dinaphtylendioxyds befassen, stellen nur geringe Abänderungen des obigen Verfahrens dar. So kann an Stelle des Kupferoxyds auch Braunstein, ja sogar Pottasche und Soda verwendet werden³⁾. Nitrobenzol läßt sich durch Nitrotoluol und noch andere hochsiedende Lösungsmittel ersetzen. Ja selbst ein Verbacken von β -Dinaphtol mit mehr Kupferoxyd ohne Gegenwart von organischen Lösungsmitteln gibt nach Corbellini und Vietti⁴⁾ recht gute Ausbeuten (bis zu 84%) an Dinaphtylendioxyd.

Dinaphtylendioxyd ist ein Chromogen mit sehr lebhafter Fluoreszenz. Es ist daher kein Wunder, daß zahlreiche Derivate dieses interessanten Körpers hergestellt wurden.

Die Darstellung der Derivate kann nach zwei grundsätzlich verschiedenen Methoden erfolgen, nämlich erstens durch Totalsynthese und zweitens durch direkte Substitution des Dinaphtylendioxyds.

1. Die Totalsynthese der Derivate des Dinaphtylendioxyds beruht auf dem gleichen Prinzip, wie die Darstellung des Dioxyds selbst. Man geht dabei von entsprechend substituierten β -Naphtholen oder β -Dinaphtolen aus, wobei substituierte Gruppen, die

1) Bünzly u. Decker Ber. 38 3269 (1905).

2) Pummerer, Prell u. Rieche. Ber. 59, 2159 (1926) D.R.P. 449 121 (1925).


3) Patente: Frdl. XVI. 449.

4) Gazz. Chim. it. 58. 766 (1928).

gegen Oxydation empfindlich sind, entsprechend geschützt werden müssen und erhitzt in hochsiedenden organischen Lösungsmitteln wie Nitrobenzol, Trichlorbenzol mit Kupferoxyd oder Braunstein.

Pummerer und Pfeiffer^{1) 2)} haben so das 4,4'-Chinon aufgebaut. Ebenso wurden verschiedene Carbonsäuren und Oxyverbindungen des Dinaphtylendioxyds synthetisiert.

Es sei hier nur die Darstellung der 3,3'-, 4,4'- 5,5'-, 6,6'-, und 7,7'-Dicarbonsäuren bzw. ihrer Ester und ebenso der 4,5-, 4'-, 5'-Tetracarbonsäure erwähnt³⁾. Die Bezifferung der Substitution veranschaulicht nebenstehende Formel:



2. Die direkte Substitution.

Dinaphtylendioxyd läßt sich direkt chlorieren. Man läßt dabei Chlor, das aus einer bestimmten Menge Salzsäure mit Wasserstoffsuperoxyd frei gemacht wird, auf Dinaphtylendioxyd einwirken, oder man chloriert besser noch mit gasförmigen Chlor in Trichlorbenzollösung⁴⁾. Je nach der dabei angewandten Chlormenge entstehen so Mono-, Di-, Tri-, Tetra- Hexa- und selbst Dekachlororderivate des Dinaphtylendioxyds. Ähnlich sind die Verhältnisse bei der Bromierung und Nitrierung. So konnten bei geeigneten Reaktionsbedingungen Mono-, Di-, Tri- Tetra- und Hexanitroverbindungen⁵⁾ dargestellt werden. Interessant sind auch die durch Einwirkung von Oxydationsmitteln auf Dinaphtylendioxyd entstehenden Oxydationsprodukte. Hier sei nur das 4,4'-Chinon erwähnt. Benzoylperoxyd⁶⁾ wirkt substituierend ein und bildet Monobenzoyloxy- und 4,4'-Dibenzoyldioxy-dinaphtylendioxyd. Phtalsäureanhydrid und Aluminiumchlorid⁷⁾ liefern Dinaphtylendioxydmono- bzw. diphtaloylsäuren. Bis jetzt ist nur ein Dibenzoylprodukt bekannt. Höhere Ringsysteme, die

1) A 503, 45. (1933).

2) Pfeiffer H. Diff. Erlangen 1933.

3) u. 4) Frdl. XVIII. 1509, 1510.

5) K. Pfeiffer Diff. Erlangen 1927. A 503, 40 (1933).

6) W. Tuchmann Diff. Erlangen 1927. H. Wilsing Diff. Erlangen 1929.

7) W. Kießling Diff. Erlangen 1926.

Dinaphtylendioxyd als Stammkörper enthalten, sind bis heute nicht bekannt, mit Ausnahme der im Anschluß an die Dinaphtylendioxydmono- bzw. diphtaloyl-säuren dargestellten Mono- und Diphtaloyl-dinaphtylendioxyde. Diese Körper enthalten jedoch noch Sulfo- und Oxygruppen, weil der Ringschluß zu den Anthrachinonsystemen nur mit sehr starken Mitteln zu erzwingen ist. Das Ziel meiner Arbeit war, auf andere Weise an den Stammkörper Dinaphtylendioxyd, möglichst unter Bildung verküppbarer Produkte, neue Ringsysteme anzugliedern. Die erhaltenen Ergebnisse sollen im folgenden geschildert werden.

B. Theoretischer Teil.

I. Die Benzoylierung des Dinaphtylendioxyds.

1. Die Darstellung des Dibenzoylkörpers.

Corbellini und Vietti¹⁾ erhielten zum ersten Male Dibenzoyldinaphtylendioxyd dadurch, daß sie nach einer Friedel-Crafts'schen Reaktion Benzoylchlorid auf Dinaphtylendioxyd bei Gegenwart von Aluminiumchlorid in Schwefelkohlenstoff einwirken ließen. W. Gündel und ich haben nach demselben Verfahren Dibenzoyldinaphtylendioxyd dargestellt. Man läßt am besten auf ein Mol Dinaphtylendioxyd reichlich zwei Mole Benzoylchlorid bei Gegenwart von etwas mehr als zwei Molen Aluminiumchlorid einwirken. Führt man die Reaktion anstatt in siedendem Schwefelkohlenstoff in Chlorbenzol bei Temperaturen bis zu 132° aus, so kann die Reaktionsdauer erheblich abgekürzt werden und gleichzeitig treten auch weniger Nebenprodukte auf.

2. Die Darstellung des Monobenzoylkörpers.

Gündel hatte seinerzeit bei der Darstellung des Dibenzoylkörpers einen in Benzol leichter löslichen braunen Körper beobachtet und er vermutete richtig, daß er nebenher entstandenes Monobenzoyldinaphtylendioxyd vor sich habe. Mir gelang es diesen Körper direkt darzustellen dadurch, daß ich ein Mol Benzoylchlorid zu einem in Chlorbenzol suspendierten Gemisch von etwas mehr als einem Mol Dinaphtylendioxyd und ebensoviel Aluminiumchlorid bei einer Temperatur von 50° zutropfen ließ.


Im allgemeinen scheint die Bildung des Dibenzoylkörpers bevorzugt zu sein. So hatte ich bei einem anderen Versuch, bei den ich diese Bedingungen nicht so genau beachtete neben nicht umgesetzten Dinaphtylendioxyd etwas Dibenzoylkörper und nur ganz wenig Monobenzoylkörper erhalten.

Derivate die mehr als zwei Benzoylreste enthalten, wurden niemals beobachtet, selbst nicht bei Verwendung eines erheblichen Überschlusses an Benzoylchlorid.


1) Gazz. chim. it. 58, 766 (1928).

3. Dibenzoyl- und Monobenzoyldinaphtylendioxyd.

Da die Analysenwerte beider Körper zu wenig voneinander verschieden sind, um eindeutig zwischen Mono- und Dibenzoyl-dinaphtylendioxyd unterscheiden zu können, wurden die Molekulargewichtsbestimmungen ausgeführt. Das gelbe Dibenzoyl- und das braune Monobenzoyldinaphtylendioxyd wurden so eindeutig festgelegt.



Monobenzoyl-dinaphtylendioxyd




Dibenzoyl-dinaphtylendioxyd

4. Die Bromderivate der Benzoyldinaphtylendioxydkörper.


Mono- und Dibenzoylkörper nehmen leicht Brom auf. Durch Einwirkung von Bromdampf auf Dibenzoyldinaphtylendioxyd entsteht vorwiegend der tetrabromierte Dibenzoylkörper, der noch durch wenig niedriger bromierte Produkte verunreinigt ist.

5. Die o-Brombenzoylderivate des Dinaphtylendioxyds.

Die in späteren Versuchen ausgeführten Benzoylierungen des Dinaphtylendioxyds mit o-Brombenzoylchlorid beruhen auf dem gleichen Prinzip wie die Umsetzung mit Benzoylchlorid und es bedarf deshalb hierzu keiner weiteren Ausführungen. Es wurden so Di-o-brombenzoyl- und Mono-o-brombenzoyl-dinaphtylendioxyd dargestellt.



Mono-o-brombenzoyl-
dinaphtylendioxyd.




Di-o-brombenzoyl-dinaphtylendioxyd

Diese Körper enthalten das Brom natürlich am Benzolkern, während bei dem vorhin erwähnten bromierten Dibenzoylkörper die Bromatome sich höchstwahrscheinlich im Dinaphtylendioxydkern befinden, dessen Brückenauerstoffatome den Eintritt des Broms sehr erleichtern.

II. Warum findet die Benzoylierung des Dinaphtylendioxyds in 4,4'-Stellung statt?

Da sich unsere Ringkörper aus diesen Benzoylkörpern des Dinaphtylendioxyds aufbauen, so war es für uns wichtig zu wissen, in welcher Stellung des Dinaphtylendioxyds die Benzoyl- bzw. substituierten Benzoylreste (o-Brombenzoylrest) eintreten. Bei den durch direkte Substitution des Dinaphtylendioxyds erhaltenen Derivaten ist man im Gegensatz zu den durch Total-synthese erhaltenen Körpern noch erheblich im Unklaren über den Ort der Substitution. Bestimmt ist bis jetzt, daß bei der Oxydation des Dinaphtylendioxyds mit den üblichen Oxydationsmitteln wie Chromsäure, Permanganat, Bleidioxyd usw. die 4,4'-Stellung bevorzugt angegriffen wird; denn das dabei entstehende Chinon konnte, wie schon erwähnt, durch Pummerer

und Pfeiffer synthetisch aufgebaut werden. In der gleichen 4,4'-Stellung befinden sich auch die Benzoatgruppen der von Tuchmann und Wilsing durch Einwirkung von Benzoylperoxyd auf Dinaphtylendioxyd dargestellten Benzoate. Lassen sich doch diese Benzoate durch die oxydierende Einwirkung konz. Schwefelsäure in 4,4'-Chinon verwandeln und umgekehrt entsteht bei der Verküpfung und Benzoylierung des 4,4'-Chinons wieder das Dibenzoat. Diese Vorgänge werden durch folgendes Schema veranschaulicht:



Die Oxydation und die Benzoatbildung findet also in 4,4'-Stellung statt. Dafür, daß auch die Benzoylreste in 4,4'-Stellung eintreten, sprechen folgende Gründe:

1. Das Verhalten des Dibenzoyldinaphtylendioxyds gegen Oxydationsmittel.

Nimmt man an, daß die Benzoylreste nicht in 4,4'-Stellung, sondern in einer beliebigen anderen Stellung (z. B. 5,5'-) sitzen, so sollte man erwarten, daß bei der Einwirkung von Oxydationsmitteln die Oxydation in der freien und beim Dinaphtylendioxyd besonders bevorzugten 4,4'-Stellung stattfindet. Man sollte also ein benzoyliertes 4,4'-Chinon erhalten. Die Versuche zeigen jedoch, daß das Dibenzoyldinaphtylendioxyd gegen Oxydationsmittel viel resistenter ist als Dinaphtylendioxyd. Milde Oxydationsmittel, wie Ferrichlorid in Eisessig, greifen es überhaupt nicht an. Durch stärkere Oxydation aber wird der Dinaphtylendioxydkern aufgespalten. Ein substituiertes 4,4'-Chinon konnte bei keinem Versuch erhalten werden. Dieses Verhalten des Dibenzoylkörpers läßt sich leicht bei Annahme einer 4,4'-Benzoylierung erklären. Oxydationsmittel werden zunächst schwerer angreifen, da die begünstigte 4,4'-Stellung besetzt ist. Tritt aber doch Oxydation ein, so könnte zwar intermediär ein beliebiges in 4,4'-Stellung benzoyliertes (z. B. 5,5'-) Chinon entstehen, das aber durch stärkere Oxydationsmittel, wie für das 5,5'-Chinon schon länger bekannt, leicht zerstört wird.

Während so Dinaphtylendioxyd ¹⁾ durch Kaliumbichromat und Schwefelsäure zu einem Chinon oxydiert wird, wird das Dibenzoylderivat unter gleichen Bedingungen nicht angegriffen. Erst bei höherer Temperatur und in stärkerer Konzentration findet Reaktion statt, wobei unter gleichzeitiger Abspaltung von Benzoesäure ein im Alkali löslicher Oxykörper entsteht. Ebenso findet bei der Oxydation mit Chromsäure in Eisessig und nach Gündel ebenfalls bei der Oxydation mit Bleitetraacetat in Eisessig eine Zerstörung des Dinaphtylendioxydkerns statt. Auch hierbei entstehen alkalilösliche Körper.

2. Das Verhalten des Dibenzoylkörpers gegen Benzoylperoxyd.

Nach Pummerer, Rieche, Tuchmann und Wilsing wirkt Benzoylperoxyd auf fein gemahlenes Dinaphtylendioxyd in heißem Benzol in äußerst lebhafter Reaktion ein, wobei sich Benzoate bilden. Mono- und Dibenzoat wurden so dargestellt. Die Ben-

1) Frdl. XVI 857. D.R.P. 483235.

zoatreste stehen, wie schon oben erwähnt wurde, in 4,4'-Stellung. Läßt man nun unter gleichen Bedingungen auf Dibenzoyldinaphtylendioxyd (ebenso Monobenzoylkörper) Benzoylperoxyd einwirken, so tritt keine Reaktion ein. Führt man jedoch den Versuch in siedendem Chlorbenzol aus, so findet eine Umsetzung statt. Es entsteht dabei ein rotbrauner Körper, der aus Benzol in Form von Blättchen kristallisiert. Wird der Körper in Schwefelsäure gelöst und mit Wasser wieder ausgefällt, so entsteht ein schwarzes nicht verküpbare Produkt. Über die Struktur des rotbraunen Körpers kann auf Grund der Analyse noch nichts bestimmtes gesagt werden. Er ist jedoch bedeutend sauerstoffhaltiger als das Dibenzoyldinaphtylendioxyd. Seine Farbe und seine außerordentlich leichte Löslichkeit in Benzol, Eisessig und Chloroform unterscheiden ihn deutlich von den von Tuchmann und Wilking beschriebenen 4,4'-Benzoaten. Von einer Benzoatbildung in 4,4'-Stellung analog Tuchmann und Wilking kann keine Rede sein.

3. Die Einwirkung von Benzoylchlorid auf 4,4'-Dinaphtondioxyd.

Nach Gündel findet bei der Einwirkung von Benzoylchlorid und Aluminiumchlorid auf 4,4'-Chinon keine Benzoylierung statt.

III. Versuche zur Darstellung des Benzoylen- und Di-benzoylen-dinaphtylendioxyds, ausgehend von den Benzoyldinaphtylendioxydkörpern.

1. Die Ringschlußmethoden.

a) Die Aluminiumchlorid-Schmelzen.

Gündel hatte bereits versucht durch Verbacken des gewöhnlichen Dibenzoyldinaphtylendioxyds mit Aluminiumchlorid bei verschiedenen Temperaturen (150–200°) und bei verschiedenen Zusätzen Ringschluß zuwege zu bringen. Er erhielt dabei braunrote, nicht verküpbare Produkte, die in Benzol leicht löslich waren und nicht kristallisierten. Als ich das Di-o-brombenzoyldinaphtylendioxyd der Aluminiumchlorid-Schmelze bei einer Temperatur von 180° unterwarf, entstand ein braunroter amorpher Körper, der sich durch seine Leichtlöslichkeit auszeichnet und der noch Halogen enthält. Scheinbar wurde also das Brom


nicht vollkommen abgespalten, oder es findet durch das Aluminiumchlorid in der Schmelze irgendwie Halogenierung statt.

Ein mit dem bromierten Dibenzoyldinaphtylendioxyd ausgeführter Backversuch lieferte einen violetten, mikrokristallinen halogenhaltigen Körper. Dieser Körper gleicht auf Grund seiner Schwerlöslichkeit in organischen Lösungsmitteln und seiner blaugrünen Lösungsfarbe in konz. Schwefelsäure dem später zu beschreibenden Dibenzoylenkörper. Vermutlich handelt es sich um einen bromierten Dibenzoylenkörper. Es ist hier ja von vornherein, selbst wenn bei der Schmelze keine weiteren Nebenreaktionen eintreten, keine vollständige Abspaltung des Broms zu erwarten, da ja das Ausgangsprodukt vorwiegend tetrabromiertes Dibenzoylprodukt ist.

b) Die Chinolin-Ätzkali-Methode.

Alle diese Backverfahren liefern halogenhaltige Produkte. Um halogenfreie Ringkörper zu erhalten, mußte nach einem Verfahren gesucht werden, das gestattet Bromwasserstoff ohne allzugroße Nebenreaktionen vollständig abzuspalten. Außerdem kamen als Ausgangsmaterial nur Körper in Betracht, bei denen Stellung und Zahl der Bromatome eindeutig festgelegt waren. Es wurden daher nur die synthetischen o-Brombenzoylkörper verwendet, denn die durch Bromierung erzeugten Benzoylkörper sind nicht vollständig einheitlich und außerdem steht die Stellung der eingetretenen Bromatome nicht eindeutig fest. Die Bromwasserstoffabspaltung wurde durch siedendes Chinolin, in dem gepulvertes Ätzkali suspendiert war, vorgenommen. Dieses Verfahren wurde schon von Zinke und Pongráš¹⁾ mit Erfolg bei der Darstellung des Isoviolanthrons aus 3,9-Dibenzoyl 4,10-dibromperylen angewandt.


1) Ber. 58. I 323, 799 (1925).



Allerdings führte dort auch die Aluminiumchlorid-Schmelze zum Ziel.

2. Benzoylen- und Dibenzoylen-dinaphtylendioxyd.


Nach diesem Verfahren konnte aus Mono-o-brombenzoyl-dinaphtylendioxyd das entsprechende halogenfreie einfache 4,5-Benzoylendinaphtylendioxyd dargestellt werden. Die folgende Gleichung verfinnbildlicht diesen Vorgang:



Benzoylen-dinaphtylendioxyd ist in den üblichen organischen Lösungsmitteln verhältnismäßig leicht löslich, kristallisiert gut und läßt sich schön sublimieren.

Der aus dem Di-o-brombenzoyl-dinaphtylendioxyd dargestellte Ringkörper dagegen ist viel schwerer löslich, kann sehr schwer mikrokristallin aus hochsiedenden organischen Lösungsmitteln erhalten werden und sublimiert selbst in Hochvakuum erst bei sehr hohen Temperaturen. (460° und 0,05 mm Druck)

Seine Entstehung bringt folgende Gleichung zum Ausdruck:



Auf Grund der verschiedenen Löslichkeiten und der verschiedenen Schmelzpunkte lassen sich beide Körper deutlich voneinander unterscheiden. Durch das Gemisch von Alkali und Chinolin wurden die Glaskolben (selbst Jenaer Glas) stark angegriffen. Die entstandenen Rohprodukte enthielten daher immer Silikat, wovon insbesondere der nur in hochsiedenden Lösungsmitteln lösliche Dibenzoylenkörper durch Umkristallisieren nicht befreit werden konnte. Erst als nach vielen Versuchen doch auch hier die Sublimation im Hochvakuum erzwungen wurde, gelangte ich zu aschefreien Produkten, die bei der Analyse befriedigende Werte gaben. Die Sublimation des Dibenzoylen-


dinaphtylendioxyds findet allerdings erst bei hoher Temperatur statt und liefert schlechte Ausbeuten. Der Dibenzoylenkörper ist entgegen allen Erwartungen, trotz der formalen Ähnlichkeiten mit Violanthron mit Natronlauge und Hypo-sulfit nicht verküppbar. Bei der Reduktion mit Zink und Eisessig geben beide Benzoylenkörper gelbe Lösungen. Wahrscheinlich werden die Ketogruppen zu den sekundären Alkoholgruppen reduziert.

3. Betrachtungen der Unverküppbarkeit des Dibenzoylen-dinaphtylendioxyds.


Warum in unserem Fall die Anlagerung von zwei Wasserstoffatomen an das dem Violanthron so ähnliche System




dung nicht richtig erfolgt, ist theoretisch vorerst nicht zu erklären. Sollte doch durch das Dioxydringsystem die obige Gruppe konjugierter Doppelbindungen weniger als solche zur Ausbildung kommen? Wahrscheinlich kommt man durch einen Vergleich der beiden Leukoverbindungen 9 und 10 der Sache näher. Die



8) Violanthron



9) Leuko-violanthron



10) nicht nachweisbares
Leuko-dibenzoylen-din.


Betrachtung von 9 zeigt, daß wahrscheinlich Violanthron nicht über das konjugierte System 7 sondern über ein längeres ver-
küpft, (links herunter) wobei 2 Anthrahydrochinonringe entstehen.
Dazu besteht bei 10 keine Möglichkeit. Hier müßte durch die
Verküpung ein Derivat des Diphenochinons entstehen. Dieses
System bildet sich aus Dinaphtylendioxyd mit Oxydationsmit-
teln leicht, hier bei der Verküpung aber offenbar sehr schwer.

4. Die in Alkali löslichen Körper.

Die bei den Chinolin-Alkali Verfahren nebenher entstan-
denen alkalilöslichen Körper konnten nicht kristallisiert erhalten
werden. Ihre Löslichkeit in Soda und ihre rotbraune Lösungs-
farbe in konz. Schwefelsäure berechtigen zu der Annahme, daß
es sich um Körper handelt, bei denen der Dioxvdring aufge-
spalten ist. Das Halogen ist durch Ätzkali wohl größtenteils ab-
gespalten.


IV. Schlußwort.

Unsere Hoffnung im Dibenzoylen-dinaphtylendioxyd einen
zum Violanthron analogen Küpenfarbstoff zu finden, wurden
somit nicht erfüllt. Es wurde daher auch noch keine eindeutige



Synthese des Ringkörpers versucht. Unsere Annahme, daß die Bromwasserstoffabspaltung unter Bildung eines 6-Rings erfolgt ist die nächstliegende. Immerhin wäre auch Abspaltung in der o-Stellung zum Brückenauerstoff, also Bildung eines Fünferings nicht ganz ausgeschlossen. Vielleicht könnte man dadurch, daß man geeignete Oxybenzanthrone der Kupferoxyd-Nitrobenzol-Schmelze unterwirft, ähnliche Systeme aufbauen. Um zu unserem Körper zu gelangen, müßte man, wie nebenstehendes Schema zeigt, vom 3-Oxy-1,9-benzanthron ausgehen.

Ein Isomeres zu unserem Körper könnte vielleicht von Bz 2'-Oxybenzanthron aus nach folgendem Schema aufgebaut werden:



Bz 2'-Oxybenzanthron.

Selbst wenn solchen Versuchen kein praktischer Erfolg beschieden wäre, so könnten sie doch immerhin interessante Aufschlüsse über das Verhalten derartig hochkondensierter Ringsysteme bei der Verkopplung liefern.

C. Experimenteller Teil.

I. Die Benzoylierung des Dinaphtylendioxyds.

1. Die Darstellung des Dibenzoylkörpers.

a) in Schwefelkohlenstoff.

14 g Dinaphtylendioxyd ($= \frac{1}{20}$ Mol), welche in 400 ccm Schwefelkohlenstoff suspendiert sind, werden mit 15 g Benzoylchlorid ($=$ etwas mehr als $\frac{2}{20}$ Mol) versetzt. Die Mischung, die sich in einem Dreihalskolben unter Quecksilberverschluß befand, wurde unter ständigem Umrühren auf dem Wasserbad zum Sieden erhitzt. In die turbinierte Mischung wurden nach und nach 18 g Aluminiumchlorid (mehr als $\frac{2}{20}$ Mol) eingetragen. Ein Teil des Aluminiumchlorids wurde bereits in der Kälte zugesetzt. Die anfangs gelbbraune Suspension färbte sich allmählich grün. Nach 4 stündigem Rühren traten bläuliche Farbtöne auf, die nach 13 Stunden in dunkelviolette Töne übergingen. Es fand lebhafte Chlorwasserstoffentwicklung statt. Nach 17 Stunden wurde die Reaktion abgebrochen. Die dunkelviolette Suspension wurde mit Eis-Salzsäure zersetzt, wobei sich das gelbe Reaktionsprodukt auschied. Nach dem Abdestillieren des Schwefelkohlenstoffs mit Wasserdampf wurde der gelbe Körper einige Male mit Salzsäure (1:1) ausgekocht, um die letzten Spuren an Aluminiumchlorid zu entfernen. Es wurde so nach sorgfältigem Auswaschen und Trocknen 24,5 g gelbes Produkt erhalten. Um nicht umgesetztes Dinaphtylendioxyd und sonstige Verunreinigungen herauszulösen, wurde das gelbe Produkt mit warmen Benzol einige Male behandelt. Es blieb dabei ein Rückstand von 20,5 g Rohprodukt; das sind 83% Rohausbeute. Die Aufarbeitung bis zum analysenreinen Körper wird im nächsten Versuch beschrieben.

Die dunkelrotbraun gefärbten und grün fluoreszierenden Benzolauszüge wurden vereinigt und konzentriert. Nach mehreren Tagen kristallisierten braune Nadeln aus. Der Körper läßt sich auch aus Eisessig umkristallisieren. Es ist das als Nebenpro-

dukt entstandene Monobenzoyldinaphtylendioxyd, dessen besondere Darstellung [später beschrieben wird.

b) in Chlorbenzol:

zu 14 g Dinaphtylendioxyd ($\frac{1}{20}$ Mol) und 18 g Benzoylchlorid (mehr als $\frac{2}{20}$ Mol), die in 310 ccm Chlorbenzol gelöst bzw. suspendiert waren, wurden 17 g fein gepulvertes Aluminiumchlorid in 2 Anteilen gegeben. Nach dem Hinzufügen des Aluminiumchlorids trat sogleich Blaufärbung ein. Innerhalb 3 Stunden wurde die Temperatur des Reaktionsgemisches auf 132° erhöht. Unter lebhafter Chlorwasserstoffentwicklung wurde das Gemisch etwas zäher und färbte sich dunkelviolet. Es wurde noch $2\frac{1}{2}$ Stunden bei 132° gerührt. Nach der Zersetzung mit Eis-Salzsäure wurde das gelbe Reaktionsprodukt wieder mit Salzsäure ausgekocht. Das Chlorbenzol wurde vorher mit Wasserdampf abgetrieben. Nach dem Auswaschen und Trocknen wurde ein von Aluminiumchlorid freies, gelbes bereits kristallines Produkt erhalten, das wiederum mit heißem Benzol behandelt wurde. Es wurden so 20,5 g Rohprodukt (= 83% Rohausbeute) erhalten. Die Benzolauszüge enthielten wieder Dinaphtylendioxyd und Monobenzoylkörper.

Das Rohprodukt wurde aus viel Trichlorbenzol umkristallisiert, wobei 13 g (= 55%) ziemlich reines Produkt vom Schmelzpunkt 319° erhalten wurde. Nach weiterem Umkristallisieren einer Teilmenge aus viel Trichlorbenzol, Pyridin und dann Phenetol wurde ein konstanter Schmelzpunkt von 324° erhalten.

Der lebhaft gelb gefärbte Körper kristallisiert in Nadeln, die fast gerade auslösch. Er schmilzt bei $324\text{--}325^{\circ}$. Die Analyse und Molekulargewichtsbestimmung ergaben folgende Werte

Analyse:

3,608 mg Subst.	10,981 mg CO_2	1,088 mg H_2O
$\text{C}_{34}\text{H}_{18}\text{O}_4$	Ber. 83,25% C	3,69% H
	Gef. 83,00% C	3,37% H

Molekulargewichtsbestimmung:

4,4304 g Chlorbenzol ($K = 4023$)

14,684 mg Substanz. $\Delta T = 0,026^{\circ}$

Molekulargewicht: Ber. 490,1 Gef. 512,8.

Dibenzoyldinaphtylendioxyd sublimiert beim trocknen Erhitzen in Proberöhrchen, wobei geringe Zersetzung eintritt. Der

Körper ist in Petroläther von 80°, in Alkohol und Schwefelkohlenstoff fast unlöslich, in Chloroform, Eisessig und Benzol in der Hitze etwas löslich und in höheren Benzolhomologen, in Chlor- und Nitrobenzol und ferner in Pyridin in der Hitze leicht löslich. Die Lösungen des Dibenzoylkörpers sind gelb gefärbt und fluoreszieren grün, während z. B. Dinaphtylendioxyd in Benzol blaue Fluoreszenz zeigt. Chlorbenzol und Pyridin sind zur Umkristallisation besonders geeignet.

In konz. Schwefelsäure löst er sich mit blauer Farbe, die nach einiger Zeit nach violett übergeht. Beim Eingießen in Wasser scheidet sich wieder der gelbe Körper aus.

2. Bromierung des Dibenzoylkörpers.

4 g auf einem Teller fein verteiltes Dibenzoyldinaphtylendioxyd blieben einige Tage im Brom-Exsikkator stehen. Sobald die gelbe Substanz mit den Bromdämpfen in Berührung kam, trat Schwarzfärbung ein. Wahrscheinlich bildete sich ein Bromadditionsprodukt. Das schwarze Produkt wurde mit heißem Alkohol behandelt, um überschüssiges Brom wegzunehmen. Der Körper färbte sich hierbei wieder gelb. Nach dem Umkristallisieren aus reichlich Chlorbenzol blieben 3,5 g gelber Körper zurück. Der zur Analyse verwendete Teil wurde aus viel Pyridin, aus Chinolin und Chlorbenzol umkristallisiert.

Der Körper sintert bei 400° zusammen und kristallisiert in schief auslöschenden Nadeln. Wie die angeführte Analyse zeigt, handelt es sich hauptsächlich um ein tetrabromiertes Dibenzoylprodukt, das noch durch niedriger bromierte Produkte verunreinigt ist. Eine scharfe Trennung der verschieden bromierten Körper dürfte wegen der ähnlichen Löslichkeitsverhältnisse nicht leicht durchführbar sein.

Analyse:

1) 5,608 mg Sbft.	10,539 mg CO ₂	1,000 mg H ₂ O
2) 5,473 mg Sbft.	10,310 mg CO ₂	0,905 mg H ₂ O
3) 0,1513 g Sbft.	0,1361 g Ag Br	
Dibromverb. C ₃₄ H ₁₆ O ₄ Br ₂	Ber. 62,97% C,	2,48% H, 24,66% Br
Tri- C ₃₄ H ₁₅ O ₄ Br ₃	Ber. 56,13	2,08 32,98
Tetra- C ₃₄ H ₁₄ O ₄ Br ₄	Ber. 50,64	1,75 39,67
1) Gef. 51,21% C	2,00% H	38,28% Br
2) Gef. 51,38	1,85	— —

3. Die Darstellung des Monobenzoylkörpers.

14,1 g Dinaphtylendioxyd ($1/20$ Mol) werden in 300 ccm Chlorbenzol gelöst bzw. suspendiert und mit 7 g ($1/20$ Mol) Aluminiumchlorid in 2 Anteilen versetzt. In die turbinierte Mischung läßt man innerhalb 7 Stunden 7 g Benzoylchlorid ($1/20$ Mol), die in 50 ccm Chlorbenzol gelöst sind, eintropfen. Bei Zugabe des Benzoylchlorids färbt sich das vorher grüne Reaktionsgemisch blau und gleichzeitig tritt Chlorwasserstoffentwicklung besonders bei Temperatursteigerung auf 50° , ein. Im ganzen wurde $14\frac{1}{2}$ Stunden bei 10° und $\frac{1}{2}$ Stunde bei 50° gerührt. Nach der Behandlung mit Eis-Salzsäure, dem Abdestillieren des Lösungsmittels, dem Auskochen mit Salzsäure (1:1) und Wasser wurde ein brauner Körper erhalten, der zwecks Reinigung von unverändertem Dinaphtalendioxyd mit Petroläther (80°) extrahiert wurde. Auf diese Art konnten 16 g Rohprodukt (= 85 % Rohausbeute) erhalten werden. Das Rohprodukt ist bereits kristallin. Der Körper wurde einmal aus viel Benzol und dreimal aus Eisessig umkristallisiert. Er hatte einen konstanten Schmelzpunkt von 252° .

Monobenzoyldinaphtylendioxyd kristallisiert aus Eisessig in braunen, schief auslöschenden Prismen. Der braune Körper ergab die folgenden Werte:

Analyse:

4,864 mg Sbst.	14,997 mg CO_2	1,673 mg H_2O
$\text{C}_{27}\text{H}_{14}\text{O}_3$	Ber. 83,92 % C	3,65 % H
	Gef. 84,09	3,85

Molekulargewichtsbestimmung:

5,952 g Chloroform ($K = 3880$)

15,369 mg Sbst.

$\Delta T = 0,024^{\circ}$

Molekulargewicht Ber. 386,1

Gef. 390,6.

Der Körper ist in siedendem Petroläther (von 80°) wenig löslich, in Chloroform, Eisessig, Benzol und Schwefelkohlenstoff kalt wenig, heiß jedoch löslich; in Chlorbenzol Pyridin und anderen höher siedenden Lösungsmitteln aber leicht löslich. Die Lösungen sind dunkelgelb bis braun und fluoreszieren stark grün. Beim Lösen in konz. Schwefelsäure treten im ersten Augenblick

violette dann blaue Farbtöne auf. Behandelt man in Eisessig gelöstes Monobenzoylprodukt in der Siedehitze mit Eisessig-Brom-Lösung, so entsteht ein Gemisch verschieden hoch bromierter Derivate, das aus Xylol in Form von gelben Nadeln kristallisiert.

4. Die Darstellung des Mono-o-brombenzoyl-dinaphtylen-dioxyds.

14 g Dinaphtylendioxyd ($1/20$ Mol) werden mit 8 g fein gepulvertem Aluminiumchlorid in 250 ccm Chlorbenzol suspendiert. Im Laufe einer Stunde läßt man zu der grünen, turbinierten Mischung eine Lösung von 10 g (= $1/20$ Mol) o-Brombenzoylchlorid in 50 ccm Chlorbenzol tropfen. Man rührt das Gemisch noch 6 Stunden bei einer Temperatur von 70° . Die Masse wird dabei ziemlich zäh und färbt sich blau bis dunkelviolett. Nach der üblichen Zersetzung und Aufarbeitung wurden 20,2 g braunes Rohprodukt erhalten, das sind 87% der Theorie. Durch Umkristallisieren aus Chlorbenzol und Pyridin läßt sich der Körper auf einen konstanten Schmelzpunkt von 308° bringen. Sehr rein kann der Körper durch Sublimation im Hochvakuum erhalten werden. Er sublimiert bei einer Temperatur von 270 bis 280° und einem Druck von 0,5 mm fast vollständig. Das Sublimat ist kristallin.

Die aus Pyridin erhaltenen Prismen und spindelförmigen braunen Kristalle schmelzen bei 308° . Die Elementaranalyse ergab:

1) Umkrist. Körper:

5,266 mg Sbft.	13,450 mg CO ₂	1,574 mg H ₂ O
0,1851 g Sbft.	0,0758 g Ag Br	

2) Sublimierter Körper:

4,723 mg Sbft.	12,157 mg CO ₂	1,206 mg H ₂ O
C ₂₇ H ₁₃ O ₃ Br	Ber. 69,68% C	2,80% H
	Gef. 1) 69,66	3,35
	2) 70,20	2,86
		17,19% Br
		17,41

Mono-o-brombenzoyl-dinaphtylendioxyd ist in Petroläther unlöslich, in Benzol, Chloroform und Eisessig besonders in der Siedehitze löslich. In Chlorbenzol und Pyridin ist es leicht löslich. Die Lösungen sind gelbbraun und zeigen grüne Fluoreszenz. Konz. Schwefelsäure löst den Körper mit blauer bis violetter Farbe.

5. Darstellung des Di-o-brombenzoyl-dinaphtylendioxyds.

Zu 14 g (= $\frac{1}{20}$ Mol) Dinaphtylendioxyd und 23 g (mehr als $\frac{2}{20}$ Mol) o-Brombenzoylchlorid, die in 200 ccm Chlorbenzol gelöst waren, wurden 15 g (über $\frac{2}{20}$ Mol) Aluminiumchlorid in 2 Anteilen hinzugefügt. Nach einstündigem Rühren in der Kälte wurde die Temperatur des Reaktionsgemisches bis auf 130° erhöht. Es trat wieder lebhafte Chlorwasserstoffentwicklung ein, und die Masse färbte sich blau, dann dunkelviolet. Nach 2 Stunden langem Rühren bei 132° wurde die Zersetzung mit Eis-Salzsäure und die weitere übliche Aufarbeitung vorgenommen. Das trockene gelbe Produkt wurde hierauf mit kaltem Benzol ausgeschüttelt. Es konnten so nach einer Umkristallisation aus Chlorbenzol 16 g gelbes Produkt erhalten werden (Smp. 325—328°). Durch wiederholtes Umkristallisieren einer kleinen Menge aus Chlorbenzol, Pyridin und Xylol wurde der reine Körper vom Schmelzpunkt 346° erhalten.

Di-o-brombenzoyldinaphtylendioxyd kristallisiert aus den angeführten Lösungsmitteln in langen schief auslöschenden Nadeln.

Analyse:

	4,576 mg Sbft.	10,363 mg CO ₂	1,074 mg H ₂ O
	0,1234 g Sbft.	0,0712 g Ag Br	
C ₃₄ H ₁₆ O ₄ Br ₂	Ber. 62,97% C	2,48% H	24,66% Br
	Gef. 62,95% C	2,63% H	24,56% Br

Der Körper ist etwas leichter löslich als das entsprechende bromfreie Dibenzoylprodukt. Er ist in Petroläther von 80° kaum, in Benzol, Chlorbenzol und Pyridin jedoch in der Siedehitze leicht löslich. Die Lösungen sind ebenfalls gelb und fluoreszieren grün. In konz. Schwefelsäure löst er sich mit blauer bzw. violetter Farbe.

Die Darstellung des reinsten Körpers vom Schmelzpunkt 346° ist verlustreich und zeitraubend, denn es sind immer Spuren des Mono-o-brombenzoylkörpers als Verunreinigung vorhanden. Dieser läßt sich, da seine Löslichkeit vom Diprodukt wenig verschieden ist, nur sehr schwer abtrennen. Geringe Mengen des Monokörpers bewirken aber eine erhebliche Depression des Schmelzpunktes. Zu den Ringchlußversuchen wurden meist Fraktionen vom Schmelzpunkt 326—329° verwendet.

Wie die unten angeführte Brombestimmung zeigt, bestehen

diese noch durchwegs aus Di-o-brombenzoylprodukt. Die geringen Anteile an Mono-o-brombenzoylkörper spielen keine Rolle.

Brombest. nach Carius bei einer Fraktion vom Smp. 326—329°:

0,1395 g Sbft. 0,0799 g Ag Br

Diprodukt Ber. 24,66% Br Gef. 24,37.

II. Versuche zu Teil II des theoretischen Teils.

1. Das Verhalten des Dibenzoxyldinaphtylendioxyds gegen Oxydationsmittel.

a) Oxydation mit Bichromat in schwefelsaurer Lösung.

Zu 2 g Dibenzoxyldinaphtylendioxyd, die in 80 g 25%iger Schwefelsäure fein verteilt waren, wurde eine Lösung von 5 g Bichromat in 40 ccm Wasser gegeben. Obwohl durch Umrühren für gute Durchmischung gesorgt wurde, trat keine Reaktion ein. Dinaphtylendioxyd wird unter den gleichen Bedingungen bereits oxydiert. Erst als die Menge des Bichromats verdoppelt und gleichzeitig die Temperatur des Gemisches auf 90° erhöht wurde, fand Reaktion statt. Die gelbe Bichromatlösung wurde zur grünen Chromisalzlösung reduziert. Das sich beim Erkalten auscheidende Rohprodukt bestand außer aus unveränderten Dibenzoxylkörper noch aus einem alkalilöslichen braunen Oxykörper und aus Benzoesäure. Durch das Oxydationsmittel wurde unter Abspaltung von Benzoesäure der Dinaphtylendioxykern gesprengt. Ein verküpfbares Chinon trat nicht auf.

b) Oxydation mit Chromsäure in Eisessig.

0,8 g Dibenzoxylkörper wurden in 20 ccm Eisessig fein verteilt. Die Suspension wurde hierauf mit 1,6 g Chromsäure, die in 20 ccm Eisessig gelöst waren, versetzt, und 2 Stunden lang zum Sieden erhitzt. Es trat vollkommene Lösung des Dibenzoxylproduktes ein. Das Chromat wurde zum Chromisalz reduziert. Der bei Zugabe von Wasser ausflockende Niederschlag ist in Alkali vollkommen löslich und nicht verküpfbar.

2. Das Verhalten des Dibenzoxylkörpers gegen Benzoylperoxyd.

Zu 0,8 g Dibenzoxyldinaphtylendioxyd, die in 30 ccm Chlorbenzol mit gelber Farbe und grüner Fluoreszenz gelöst waren, wurden 1,5 g Peroxyd gegeben. Die Lösung wurde 2 Stunden

lang am Rückflußkühler zu Sieden erhitzt. Sobald die Siedetemperatur des Chlorbenzols erreicht war, färbte sich die Lösung rotbraun. Die grüne Fluoreszenz verschwand. Aus der erkalteten Lösung konnte mit Petroläther ein rotbrauner Körper gefällt werden. Dieser wurde mit warmen Alkohol behandelt, ummitgefälltes Benzoylperoxyd zu lösen. Dann wurde der Körper in Benzol gelöst. Aus den konzentrierten Benzollösungen kristallisierte er in Form von Blättchen aus. Er ist in siedendem Alkohol etwas löslich, Benzol, Eisessig, Chloroform und höher siedende Lösungsmittel lösen ihn spielend. Wie eine vorerst ausgeführte Analyse ergab, ist er sauerstoffreicher als das Dibenzoyl-dinaphtylendioxyd. Wurde Monobenzoyldinaphtylendioxyd für längere Zeit mit einem Überschuß an Benzoylperoxyd in Benzol zum Sieden erhitzt, so entstand ein ähnlicher leicht löslicher Körper.

III. Versuche zur Darstellung der Benzoylenverbindungen, ausgehend von den o-bromierten Benzoylderivate des Dinaphtylendioxyds.

1. Versuche mit Aluminiumchlorid.

2 g Di-o-brombenzoylendinaphtylendioxyd (Smp. 326—329°), die mit 10 g fein gepulverten Aluminiumchlorid gut durchgemischt waren, wurden in einem weiten Reagenzglas mit aufgesetztem Chlorcalciumrohr in einem Paraffinbad auf 180° erhitzt. Das Gemisch sinterte bei 140° bereits zusammen und färbte sich violett. Eine lebhafte Bromwasserstoffentwicklung trat ein. Die Temperatur wurde 3 Stunden lang auf 180° gehalten. Nach dem Zerschlagen des Rohres wurde die dunkelviolette pulverisierte Schmelze mit Salzsäure und Wasser zersetzt. Es blieben nach wiederholtem abwechselnden Auskochen mit Salzsäure, Wasser und Lauge 1,6 g eines braunroten Körpers zurück. Der Körper wurde aus Chloroform, worin er sich mit rotbrauner Farbe fast vollkommen löst, umgefällt (1,4 g). Da eine Probe, die sich aus Pyridin mikrokristallin ausschied, noch halogenartig war, wurden diese Versuche nicht weiter fortgesetzt.

Ein unter ähnlichen Bedingungen ausgeführter Backversuch mit Aluminiumchlorid am bromierten Dibenzoylkörper ergab als Hauptprodukt einen dunkelvioletten Körper. Dieser Körper ist in Chloroform unlöslich, in Pyridin in der Siedehitze etwas lös-

lich und in siedendem Chinolin löslich. Aus Chinolin läßt er sich mikrokristallin erhalten. Er ist ebenfalls halogenhaltig. In konz. Schwefelsäure löst er sich mit blaugrüner Farbe.

2. Versuche mit Chinolin-Ätzkali.

a) Darstellung des Mono-benzoylen-dinaphtylendioxyds.

In einem Jenaer Kolben mit aufgesetztem Steigrohr wurden 2 g Mono-o-brombenzoyl-dinaphtylendioxyd, 60 ccm Chinolin und 4 g gepulvertes Ätzkali 2 Stunden lang zum Sieden erhitzt. Die gelb gefärbte und grün fluoreszierende Lösung nahm, sobald die Siedetemperatur des Chinolins erreicht war, orange bis rote Farbtöne an. Beim Abkühlen kristallisierte bereits ein Teil des Ringkörpers in Form roter Nadeln aus. Durch Wasserdampfdestillation wurde aus dem Reaktionsgemisch das Chinolin entfernt. Die tiefrote, stark alkalische Suspension wurde hierauf filtriert. Das zurückbleibende alkalienlösliche Rohprodukt wurde noch einige Male mit Natronlauge behandelt, um die letzten alkalilöslichen Anteile herauszulösen. Aus den vereinigten tiefroten alkalischen Filtraten konnte durch Salzsäure ein brauner Körper ausgeflockt werden, der nicht weiter untersucht wurde.

Der alkalienlösliche Rückstand wurde, nach abwechselnden Auskochen mit verd. Salzsäure und Wasser, getrocknet.

Es wurden 1,3 g Rohprodukt (=78,7% Rohausbeute) erhalten, die beim Umkristallisieren aus Chlorbenzol auf 0,75 g zusammen-schmolzen. Da eine aus Pyridin und Xylol umkristallisierte Probe noch aschehaltig war, wurde der Körper durch Sublimation gereinigt. Der Körper sublimierte bei einer Temperatur von 280–300° und einem Druck von 0,5–1 mm vollkommen. Das Sublimat bestand aus Blättchen. Der rote Körper kristallisiert aus Chlorbenzol, Pyridin und Xylol in feinen Nadeln, die schief auslöschten. Beim Erhitzen im Schmelzpunktsröhrchen tritt ab 315° geringe Sublimation ein. Bei 323° schmilzt er zu einer zähen braunroten Masse zusammen. Die Analyse ergab:

Analyse:

4,287 mg Sbft.	13,248 mg CO ₂	1,296 mg H ₂ O
C ₂₇ H ₁₂ O ₃	Ber. 84,35% C	3,15% H
	Gef. 84,28	3,38

Mono-benzoylen-dinaphtylendioxyd ist in siedendem Eisessig

und Benzol etwas löslich. Es löst sich ferner in siedendem Chloroform; Pyridin, Chlorbenzol, Xylol oder Chinolin ist es leicht löslich. Seine rhodaminroten Lösungen zeigen orange bis gelbe Fluoreszenz. Spuren des Körpers lösen sich in konz. Schwefelsäure mit blaugrüner Farbe, größere Mengen mit blauer Farbe. Die Lösungen in Schwefelsäure zeigen deutlich rotbraune Fluoreszenz. Mit Phenylhydrazin in Eisessig tritt keine Reaktion ein. Durch Zink in Eisessig wird er reduziert, wobei die Farbe nach gelb umschlägt.

b) Die Darstellung des Di-benzoylen-dinaphtylendioxyds.

2 g Di-o-brombenzoylkörper (Smp. 326–329°) wurden mit 6 g gepulvertem Ätkali in Chinolin zum Sieden erhitzt. Bei der Siedetemperatur des Chinolins schlug die gelbe Farbe der Lösung nach scharlachrot um. Nach 2 Stunden wurde das Chinolin mit Wasserdampf abgetrieben. Das nach dem Abfiltrieren erhaltene alkaliunlösliche Produkt wurde mehrmals mit Lauge, Wasser und Säure ausgekocht und dann getrocknet. Der Versuch ergab 1,3 g an alkaliunlöslichen Rohprodukt. Bei anderen Versuchen war die Ausbeute an alkaliunlöslichen Körper meist schlechter. Aus den tiefroten alkalischen Filtraten wurde durch Salzsäure ein amorpher brauner Körper gefällt.

Die Aufarbeitung des alkaliunlöslichen Rohprodukts geschah wie folgt:

1,8 g des Rohprodukts wurden, um alle niedrig molekularen Bestandteile herauszulösen mit siedendem Pyridin behandelt. Nach dem Abfiltrieren der schmutzigen Pyridinlösung blieb ein Rückstand von 0,8 g zurück.

Durch wiederholtes Erhitzen kleiner Mengen mit Chinolin konnte der Körper zum größten Teil in Lösung gebracht werden. Aus dem konzentrierten Chinolinlösungen schied er sich außerordentlich langsam und unvollkommen mikrokristallin aus. Die Substanz enthielt aber wegen des mitgeführten Silikats stets Asche und ergab keine befriedigende Analysenwerte. Erst als eine Sublimation durchgeführt wurde, war der Körper analysenrein. Die bei 460° und 0,05 mm Druck ausgeführte Sublimation lieferte mäßige Ausbeuten. Es wurden nur bis zu 0,1 g reines Produkt erhalten. Die Mikrobefimmung des sublimierten Anteils ergab:

1) 4,585 mg Sbft.	14,145 mg CO ₂	1,196 mg H ₂ O
2) 4,758 mg Sbft.	14,655 mg CO ₂	1,573 mg H ₂ O
C ₃₄ H ₁₄ O ₄	Ber. 83,93% C	2,88% H
	Gef. 1) 84,14	2,92
	2) 84,00	3,70

Der sublimierte Ringkörper besteht aus roten prismatischen Kristallen, die schief auslöschten. Der Körper sintert erst bei schwacher Rotglut zusammen. Er ist nur in ganz hochsiedenden organischen Lösungsmitteln wie Chinolin, Nitrobenzol und Trichlorbenzol in der Hitze löslich. Die Lösungen sind blaurot und zeigen orange Fluoreszenz. Spuren lösen sich in konz. Schwefelsäure mit grüner Farbe, größere Mengen mit blaugrüner Farbe und rotbrauner Fluoreszenz. Aus seiner Lösung in Schwefelsäure kann der Körper durch Wasser wieder gefällt werden. Durch Natronlauge und Hyposulfit läßt er sich nicht verküpfen, auch nicht bei Pyridinzusatz. Beim Erhitzen mit Eisessig und Zink wird er zu einer gelben Verbindung reduziert.

c) Der alkalilösliche Körper.

Der nebenbei entstehende alkalilösliche Körper wurde in Dioxan gelöst. Da auch beim Konzentrieren keine Kristallation stattfand, wurde der Körper mit Wasser gefällt. Der fast halogenfreie, braune Körper löst sich in Soda mit braunroter Farbe. Seine Lösung in Schwefelsäure ist ebenfalls braun.

Lebenslauf.

Am 28. Oktober 1908 wurde ich, Hans Stinzendörfer als Sohn des Postsekretärs Johann Stinzendörfer und seiner Ehefrau Margareta, geb. Sippel zu Eltersdorf in Mittelfranken geboren. Nach 4 jährigem Besuch der dortigen Volksschule besuchte ich die Realschule zu Erlangen und die Oberrealschule zu Fürth, wo ich im März 1928 die Reifeprüfung ablegte. Ich studierte an den Universitäten Erlangen und Wien zunächst Naturwissenschaften, später Chemie. Zu Erlangen legte ich die beiden Verbandsexamina ab. Ich bin deutscher Staatsangehöriger.
